

SNIPER®

Експрес-тестування на наявність  
наркотичних речовин.


---

*Pharmasco*®

# Розповсюдженість заборонених речовин

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Розповсюдженість: списки психоактивних речовин



Список психотропных речовин, що знаходяться під міжнародним контролем (МККН, 30 изд., 2019)

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
Постанова від 06.05.2000 № 770  
Зі змінами та доповненнями від 10 березня 2021 року N 192

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# КЛАСИФІКАЦІЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Наказ МОЗ № 651 зі змінами від 04.08.2022 (№ 1400)

---

Наказ від 18.04.2022 № 651 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» зі змінами від 04.08.2022 (№ 1400)

4. Обсяг Огляду включає в себе **психіатричний огляд**, проведений у відповідності до статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу», **лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину** методом капілярного електрофорезу та **в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин**.

У разі відсутності технічної можливості здійснити лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу на період дії воєнного стану в Україні та шести місяців після припинення або скасування такого стану, дозволяється проведення **лабораторного дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові**. (Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1400 від 04.08.2022)

5. Для здійснення лабораторного **тестування на наявність психоактивних речовин** лікар-психіатр має **забезпечити забір крові та сечі у особи**, яка проходить Огляд.

6. Лабораторне тестування сечі на наявність в організмі наркотичних засобів і психотропних речовин має включати в себе **дослідження на наявність чи відсутність опіоїдів, канабіоїдів, седативних чи снодійних засобів, кокаїну, галюциногенів, психостимуляторів**.

The logo for Pharmasco, featuring the word "Pharmasco" in a stylized, cursive script font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

	КАННАБІС	СИНТЕТИЧНІ АГОНІСТИ КАННАБІОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ	ОПІЙ ТА ОПІАТИ	ОПІОЇДИ (синтетичні)	КОКА ТА КОКАЇН	СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНИ	ДЕПРЕССАНТИ ЦНС	ГАЛЛЮЦИНОГЕНИ
<b>Госпітальні монополоски</b>	- маріхуана	- синтетична маріхуана (спайс)	- морфін	- метадон - ЕДДП (метаболіт метадона) - бупренорфін - пропоксифен - трамадол	- кокаїн	- амфетамін - метамфетамін - МДМА (екстазі) - МДПВ (солі) - <b>мефедрон (мяу-мяу, солі)</b>	- бензодіазепін - барбітурати - прегабалін - трициклічні антидепрессанти	- <del>ЛСД</del> - фенциклідін - кетамін
<b>SNIPER® 5 госпіт.</b>	маріхуана		морфін	бупренорфін		амфетамін метамфетамін		
<b>SNIPER® 5+ (шкала) госпіт.</b>	маріхуана		морфін		кокаїн	амфетамін метамфетамін		
<b>SNIPER® 10 госпіт.</b>	маріхуана		морфін	метадон	кокаїн	амфетамін метамфетамін МДМА (екстазі)	бензодіазепін барбітурати	фенциклідін
<b>SNIPER® 10+ (шкала) госпіт.</b>	маріхуана		морфін	метадон	кокаїн	амфетамін метамфетамін МДМА (екстазі)	бензодіазепін барбітурати	фенциклідін
<b>ТЕСТ-КОНТЕЙНЕР</b>	<b>маріхуана</b>	<b>синтетична маріхуана (спайс)</b>		<b>метадон</b>		<b>МДМА (екстазі)</b>	<b>барбітурати</b>	<b>фенциклідін</b>
<b>SNIPER 5 ALFA (розніца)</b>	маріхуана		морфін		кокаїн	амфетамін метамфетамін		
<b>SNIPER 10 ALFA (розніца)</b>	маріхуана	синтетична маріхуана (спайс)	морфін	метадон трамадол бупренорфін	кокаїн	амфетамін метамфетамін МДМА (екстазі)		

Опіюїди	Опій та опіати	морфін
	Синтетичні: опіюїди	метадон ЕДДП (метаболіт метадона) бупренорфін пропксифен трамадол
Каннабіюїди	Каннабіс	маріхуана
	Синтетичні агоністи каннабіюїдних рецепторів	синтетична маріхуана (спайс)
Седативні/снодійні засоби	Депресанти ЦНС	бензодіазепін барбітурати прегабалін трициклічні антидепресанти
Кокаїн	Кока та кокаїн	кокаїн
Галюціногени	Галюціногени	ДСД фенциклідін кетамін
Психостимулятори	Стимулятори (амфетаміни)	амфетамін метамфетамін МДМА (екстазі) МДПВ (солі) мефедрон (мяу-мяу, солі)

**КАННАБІС**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# КАННАБІС: маріхуана



## Маріхуана (трава)

Висушений матеріал (верхівки рослини канабіс з квітами або плодами) зеленого або коричневого кольору.

## Жаргонні назви

Трава  
Травка  
План  
Косяк  
Марихуана  
Дурь  
Конопля

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Розсипчаста маса (загортають у невелику паперову трубку або накручують на паличку)

Подрібнена маса (змішують із вершковим маслом, в результаті одержують «каннабісне масло» для виготовлення «гашишних тістечок» або «космічних кексів»; або заварюють окропом)


### ✓ **Спосіб введення**

Вдихання (паління, вдихання пари)

Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# КАННАБІС: смола каннабіса



## Смола каннабіса

Відокремлена смола,  
неочищена або очищена,  
отримана з рослини канабіс

## Жаргонні назви

Чарас  
Гашиш  
Чернушка  
Киф  
Хаш

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Дрібний порошок (у тому числі спресований у плитки)

Розсипчастий або спресований клейкий порошок

Смола, спресована або скручена в плитки, палички, кульки або ін.

### ✓ **Спосіб введення**

- Вдихання (у чистому вигляді або з тютюном)
- Пероральний прийом (з їжею та чаєм)

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# КАННАБІС: масло каннабіса



## Масло каннабіса

Отримують шляхом екстрагування з неочищеного рослинного матеріалу, каннабісу або смоли каннабісу за допомогою органічного розчинника.

## Жаргонні назви

Гашишное масло  
Янтарное масло  
Медовое масло  
Красное масло

### ✓ Форми, що широко використовуються

В'язка рідина

### ✓ Спосіб введення

- Вдихання – шляхом додавання 1-2 крапель у тютюн чи паровий інгалятор
- Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Застосування у медицині

---

- Набіксимол (Sativex®) – рідкий екстракт каннабісу, що містить ТГК і каннабідіол, який призначають для усунення болю та м'язової спастичності при множинному склерозі.
- Дронабінол (Marinol®) – специфічний синтетичний ізомер ТГК, який призначають при втраті апетиту хворими на СНІД, а також пацієнтам з раком при нудоті та блюванні під час проходження хіміотерапії.

# Механізм дії та наслідки

## Очікуємий ефект

- Гарне самопочуття, ейфорія
- Веселість
- Розслаблення
- Загострення зору, нюху, смаку та слуху

## Небажана гостра дія

- Прискорене серцебиття
- Порушення когнітивного розвитку (навчання)
- Зниження моторної координації, виконання складних завдань
- Можливий розвиток тривожних станів, параної, гострих психозів.
- Почервоніння очей
- Можливе спотворення сприйняття звуків, кольорів та інших зовнішніх подразників, уповільнення та сплутаність мислення

## Наслідки хронічного вживання

- Психологічна залежність
- Розвиток толерантності
- Психічні проблеми
- Втрата енергії та інтересу до життя
- Можливі розвиток раку легень, бронхіту, запалення легенів та ін.
- Загострення психозу чи шизофренії
- При вагітності: затримка розвитку плода чи постнатальні проблеми
- Можливий розвиток синдрому каннабіоїдної гіперемезиса

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script font with a registered trademark symbol.

# СИНТЕТИЧНІ АГОНІСТИ КАННАБІОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ (САКР)

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СИНТЕТИЧНІ АГОНІСТИ КАННАБІОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ: спайс



## Спайс

Речовини, що мають структурні характеристики, які дозволяють зв'язувати один з відомих каннабіоїдних рецепторів.

## Жаргонні назви

К2  
Спайс  
Ладан  
Кроник

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Трав'яна суміш, на яку розпорошенням нанесений спайс
Біла тверда кристалічна речовина
Порошок
Таблетки

### ✓ **Спосіб введення**

Вдихання (в т.ч. і парова інгаляція)
Пероральний прийом
<ul style="list-style-type: none"><li>• Вдихання через нос</li><li>• Пероральний прийом</li></ul>
Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІЙ та ОПІАТИ

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІЙ та ОПІАТИ: морфін



## Морфін

Головний алкалоїд, що витягується з опію або макової соломки.

## Жаргонні назви

Белый  
Беленький  
Белдыга

### ✓ Форми, що широко використовуються

Дрібний порошок
Таблетки

### ✓ Спосіб введення

Ін'єкції
Пероральний прийом

# ОПІЙ та ОПІАТИ: героїн



## Героїн (діаморфін чи діацетилморфін)

Напівсинтетичний опіат, що отримується з морфіну.

**Сіль:** гідрохлорид діацетилморфіну.

**Основа:** діацетилморфін.

## Жаргонні назви

Белая леди

Гера

Герман

Герыч

Гертруда

Хмурый

Перец

Лошадь

Убойный

Второй

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Героїн №2 – героїнова основа, не перетворена на гідрохлорид

Героїн №3 – придатний для куріння героїн

Героїн №4 – придатний для ін'єкцій

### ✓ **Спосіб введення**

- Ін'єкції
- Перназально
- Куріння

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Гарне самопочуття, ейфорія
- Аналгезія (знеболення)
- Почуття задоволення, розслабленість та відстороненість від емоційних переживань та фізичного нездужання

## Небажана гостра дія

- Сонливість, нездатність концентруватися, апатія, фізична загальмованість
- Можливі нудота та блювання
- Пригнічення дихання, аж до смерті
- Звуження зіниць
- Можлива стимулююча дія

## Наслідки хронічного вживання

- Стрімкий розвиток толерантності, фізичної та психологічної залежності
- Руйнування носової перегородки при вдиханні через ніс
- Респіраторні проблеми під час куріння
- Виснаження, втрата ваги
- Апатія
- Запори
- Абстинентний синдром («ламання»)

*Pharmasco*<sup>®</sup>

ОПІОЇДИ

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІОЇДИ: метадон



## Метадон

Синтетичний опіоїдний лікарський засіб пролонгованої дії, призначений для підтримуючої терапії при опіоїдній залежності

## Жаргонні назви

Мед  
Мясо  
Лошадка

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Порошок білого кольору

Таблетки

### ✓ **Спосіб введення**

Ін'єкції

Перорально

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІОЇДИ: ЕДДП (метаболіт метадона)



## ЕДДП

2-етиліден-1,5-діметил-3,3-  
дифенілпіролідін  
Неактивний метаболіт  
метадона

ЕДДП є основним метаболітом метадону.

В залежності від рН сечі, кількості сечі, дози та швидкості метаболізму може змінюватися відсоток виведення незмінного метадону у кожної людини.

Існує категорія населення, класифікованих як "екстенсивні метаболізатори" метадону, у яких вміст незмінного метадону в сечі може не визначатися при скринінговому дослідженні, навіть якщо ця людина знаходилась на підтримуючій терапії метадонем.

**Виявлення ЕДДП в сечі є кращим маркером підтвердження вживання метадону.**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІОЇДИ: бупренорфін



## Бупренорфін

Синтетичний опіоїдний лікарський засіб пролонгованої дії, призначений для підтримуючої терапії при опіоїдній залежності

## Жаргонні назви

Буп  
Буприк  
Субсик

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Таблетки

Білий кристалічний порошок

### ✓ **Спосіб введення**

- Перорально
- Сублінгвально, интабуккально
- Ін'єкції

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІОЇДИ: пропоксифен



## Пропоксифен

Наркотичний аналгетик. За структурою близький до метадону, але має більш слабку знеболювальну дію. «Молодший брат метадону»

### ✓ Форми, що широко використовуються

Таблетки чи капсули

### ✓ Спосіб введення

Перорально

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ОПІОЇДИ: трамадол



## Трамадол

Психотропний опіоїдний  
аналгетик.  
Прекурсор.  
За активністю поступається  
морфіну.

## Жаргонні назви

Трам

### ✓ Форми, що широко використовуються

Капсули
Розчин
Суппозиторії

### ✓ Спосіб введення

Перорально
Ін'єкції
Ректально

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Ейфорія
- Релаксація
- Аналгезія (знеболюючий ефект)
- Підвищена уважність

## Небажана гостра дія

- Пригнічення дихання, седативний стан
- Нудота блювота
- Запаморочення, втома, головний біль
- Сонливість, запори, пітливість
- Анемія, периферичний набряк
- М'язова ригідність

## Наслідки хронічного вживання


- Розвиток залежності та толерантності
- Можлива зупинка серця або гостра анафілактична реакція
- Симптоми абстинентного синдрому (потівливість, тривожний стан, діарея, ломота в кістках, коліки, озноб або «гусяча шкіра»)
- Запори

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script font with a registered trademark symbol.

# КОКА та КОКАІН

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# КОКА та КОКАЇН: кокаїн



## Кокаїн

Основний психоактивний алкалоїд, що міститься у листі коки. Зазвичай зустрічається у двох формах – гідрохлорид кокаїну та кокаїнова основа.

## Жаргонні назви

Базука	Крэк
Белая леди	Леди
Бланш	Мука
Звездная пыль	Пыль
Кекс	Свежий
Кока	Снег
Кокс	Ускоритель

## ✓ Форми, що широко використовуються

## ✓ Спосіб введення

Кокаїнова основа	Білий або білуватий кристалічний порошок з характерним запахом	Вдихання
Крэк	Тверді білі кристали	Вдихання
Гідрохлорид кокаїна	Білий або білуватий кристалічний порошок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перназально</li><li>• Ін'єкції</li></ul>

*Pharmasco*®

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Гарне фізичне та психічне самопочуття, приємне збудження, ейфорія
- Підвищена уважність та енергійність
- Пригнічення почуття голоду

## Небажана гостра дія

- Прискорене серцебиття, дихання, підвищення артеріального тиску
- Підвищення температури тіла, пітливість
- Звуження кровоносних судин, втрата чутливості на деяких ділянках тіла
- Підвищена збудливість, безсоння, паніка, непередбачувана та інколи насильницька поведінка
- Можливі судоми, конвульсії, галюцинації, інсульт чи зупинка серця.
- Втома, дратівливість, пригніченість, дисфорія
- Серотоніновий синдром
- Розширення зіниць

## Наслідки хронічного вживання

- Сильна фізична залежність
- Розвиток толерантності
- Руйнування тканин носа при перназальному введенні
- Хронічний бронхіт під час куріння
- Виснаження, втрата ваги
- Дезорієнтація, апатія, сплутаність свідомості, виснажений стан внаслідок безсоння
- Параноїдальний психоз
- При припиненні вживання наркотику може настати тривалий період сонливості та пригніченості.

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ: амфетамін



## Амфетамін

Виробляється у підпільних лабораторіях і надходить звідти на ринки.

## Жаргонні назви

Амфа  
Кристалл  
Порох  
Скорость  
Спид  
Шустрий  
Аппер

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Порошок від білого до світло-коричневого кольору

Розчин порошку в дистильованій або солоній воді

Таблетки та капсули

### ✓ **Спосіб введення**

- Перназально
- Куріння

Ін'єкції

Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ: метамфетамін



## Метамфетамін

Виробляється у підпільних лабораторіях і надходить звідти на ринки.  
У домашніх умовах кустарним способом  
(первітин, або винт)

## Жаргонні назви

Кристалл	Первый
Мет	Порох
Лед	Спид
Винт	Стекло
Витек	Метамфа
Виктор Палыч	Шабу

### ✓ Форми, що широко використовуються

Порошок від білого до світло-коричневого кольору	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перназально</li><li>• Куріння</li></ul>
Розчин порошку в дистильованій або солоній воді	Ін'єкції
Таблетки та капсули	Пероральний прийом
Кристали	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перназально</li><li>• Куріння</li></ul>

### ✓ Спосіб введення

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Гарне фізичне та психічне самопочуття, приємне збудження, ейфорія
- Психічне та фізичне збудження
- Вища і триваліша концентрація уваги та енергійність
- Більш ефективне виконання фізичної чи розумової роботи
- Пригнічення почуття голоду

## Небажана гостра дія

- Прискорене серцебиття, дихання, підвищення артеріального тиску
- Підвищення температури тіла, пітливість
- Непередбачувана та інколи насильницька поведінка
- Підвищена збудливість, безсоння, балакучість, стурбований стан, дратівливість, галюцинації
- Конвульсії, судоми, аритмія та/або зупинка серця, внутрішньомозковий крововилив
- Серотоніновий синдром
- Розширення зіниць

## Наслідки хронічного вживання

- Сильна фізична залежність
- Розвиток толерантності
- Виснаження, втрата ваги
- Дезорієнтація, апатія, сплутаність свідомості, виснажений стан унаслідок безсоння
- При тривалому вживанні може розвинутий стан, схожий на параноїдальний психоз – «амфетаміновий психоз»
- При припиненні вживання наркотику може настати тривалий період сонливості та пригніченості.

*Pharmasco*<sup>®</sup>

**СТИМУЛЯТОРИ  
АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ  
(речовини групи ЕКСТАЗІ)**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ: МДМА (екстазі)



## МДМА (екстазі)

Метилендіоксиметамфетамін,  
MDMA  
Подібно до амфетаміну і  
метамфетаміну, має  
стимулюючу дію на дофамін,  
норепінефрін, і, більшою  
мірою, на серотонін.

## Жаргонні назви

Адам  
Ёшка  
Мицики  
Стимул  
Рейв  
Экстези

### ✓ Форми, що широко використовуються

Порошки білого, білуватого кольору

Таблетки та капсули

### ✓ Спосіб введення

- Перназально
- Ін'єкції (рідко)

Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Відчуття емоційної близькості до інших (емпатія)
- Полегшення спілкування
- Зростаюча комунікабельність
- Підвищення рівня фізичної та емоційної активності

## Небажана гостра дія

- Прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, тепловий удар
- Підвищення температури тіла, пітливість
- Втома та можливий пригнічений стан
- Тривожний стан та виражені зорові та звукові галюцинації при прийомі великих доз
- Нудота блювота, гіпертермія
- Серотоніновий синдром

## Наслідки хронічного вживання

- Розвиток толерантності
- Можливі нейротоксична дія, психіатричні та фізичні проблеми, церебральні порушення, а також ураження печінки.
- Можливі депресивні або тривожні стани, втома та ускладнення зосередження уваги

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

**СТИМУЛЯТОРИ  
АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ  
(синтетичні катинони)  
СОЛІ**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ: МДПВ



**МДПВ**  
(метилендіоксипіровалерон)

Стимулятор.  
Дія подібна до амфетаміну  
і метамфетаміну.

**Жаргонні назви**

<b>Соль для ванн</b>	Паника
<b>Соли</b>	Удобрение
Белая волна	Ширка
Взрыв	Эмка
Космос	Эфенди
Меф	
Мулька	

✓ **Форми, що широко використовуються**

✓ **Спосіб введення**

Порошок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вдихання та куріння</li><li>• Ін'єкції</li><li>• Суппозиторії</li></ul>
Таблетки	Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# СТИМУЛЯТОРИ АМФЕТАМІНОВОГО РЯДУ: мефедрон



## Мефедрон

Стимулятор.  
Дія подібна до амфетаміну  
і метамфетаміну.

## Жаргонні назви

<b>Соль для ванн</b>	Паника
<b>Соли</b>	Удобрение
Белая волна	Ширка
Взрыв	Эмка
Космос	Эфенди
Меф	<b>Мяу-мяу</b>
Мулька	Белая магия
	Дрон

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Порошок
Таблетки
Рідина (для ін'єкцій)

### ✓ **Спосіб введення**

Вдихання
Пероральний прийом
Ін'єкції

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС: бензодіазепін



## Бензодіазепін

Депресанти ЦНС, які широко застосовуються в медицині як протисудомні, анксіолітичні, гіпнотичні та седативні засоби, міорелаксанти і транквілізатори.

## Жаргонні назви

Бензос  
Голубая бомба  
Даунер

## ✓ Форми, що широко використовуються

## ✓ Спосіб введення

Таблетки та капсули	Пероральний прийом
Рідина (гель) в капсулах	Ін'єкції

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Ослаблення напруги, емоційного стресу та тривожного стану
- Відчуття спокою, розслабленості та комфортного стану у стривожених людей
- Здатність ефективніше долати стреси
- Послаблення побічної дії, пов'язане з надмірним стимулюванням або припиненням прийому інших наркотиків

## Небажана гостра дія

- Зниження рівня психічної активності та уважності, сонливість, апатичність та можливе порушення ясності мислення та суджень
- Можливі порушення м'язової координації, запаморочення, зниження артеріального тиску або непритомність
- Загальмована емоційна реакція на зовнішні подразники, наприклад, біль

## Наслідки хронічного вживання

- Розвиток толерантності, психологічної та фізичної залежності
- Головний біль, дратівливість, сплутаність свідомості, порушення пам'яті, пригніченість, безсоння та тремор
- Різде припинення прийому може спричинити абстинентний синдром («ламання»)

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС: барбітурати



## Барбітурати

Група синтетичних депресантів ЦНС, які колись широко застосовувалися в медицині як седативно-гіпнотичні засоби.

## Жаргонні назви

Барби  
Барберы  
Барбитура  
Бешенка  
Блюз  
Дурки  
Химка

## ✓ Форми, що широко використовуються

Порошок білого кольору
Капсули чи таблетки
Рідкі фармацевтичні препарати
Суппозиторії

## ✓ Спосіб введення

Пероральний прийом
Пероральний прийом
Ін'єкції
Ректально



# Механізм дії та наслідки

## Очікуєий ефект

- Зняття напруги, емоційного стресу та тривожного стану
- Почуття задоволення, спокою, розслабленості та комунікабельності
- Легкість подолання стресу чи психологічних проблем

## Небажана гостра дія

- Пригнічення дихання, уповільнення чи почастишання серцебиття, пригнічення кошлевого рефлексу
- Сонливість, ступор, втрата свідомості, кома
- Неадекватні та непередбачувані емоційні реакції, сплутаність свідомості, дезорієнтаціяНевиразне, неконтрольоване мовлення, порушення здатності міркувати
- Порушення моторної координації, незграбність, зниження самоконтролю
- Розширення зіниць

## Наслідки хронічного вживання

- Розвиток толерантності, психологічної та фізичної залежності
- Тяжка депресія та амнезія
- Бронхіт, пневмонія
- При припиненні прийому – дратівливість, нервозність, постійний збуджений стан, тимчасове порушення сну, запаморочення та нудота, стан тривоги, тремор, можливі делірії та конвульсії

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС (інші депрессанти ЦНС)

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС (інші): прегабалін



## Прегабалін

Синтетичний  
протиепілептичний препарат.  
Анкіолітик, має  
протисудомний ефект.  
Є аналогом гамма-  
аміномасляної кислоти.

## Жаргонні назви

Лирика

✓ **Форми, що широко використовуються**

✓ **Спосіб введення**

Капсули

Перорально

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ДЕПРЕССАНТИ ЦНС (інші): трицикличні антидепресанти



## Трицикличні антидепресанти

Психотропні ЛЗ, що впливають на рівні нейромедіаторів: серотонін, норадреналін, дофамін.

### ✓ **Форми, що широко використовуються**

Таблетки
Розчин

### ✓ **Спосіб введення**

Перорально
Ін'єкції



# ГАЛЛЮЦИНОГЕНИ

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# ГАЛЛЮЦИНОГЕНИ: ЛСД (лізергід)



## ЛСД (лізергід)

Діетиламід лізергінової кислоти  
Напівсинтетичний наркотик, що одержується з лізергінової кислоти, алкалоїд, присутній у грибку *Claviceps purpurea* (ріжків), який росте на житі та інших зернових культурах.

## Жаргонные названия

Кислота  
Промокашка  
Хиппи

### ✓ Форми, що широко використовуються

- Просочена розчином бумага (промокашка)
- Міні-таблетки та капсули
- Тонкі желатинові пластинки («оконные стекла»)

### ✓ Спосіб введення

Пероральний прийом

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуємий ефект

- Зміна розумового процесу, настрою та сприйняття відчуттів, «розширення свідомості»
- Емпатія, полегшення спілкування та комунікабельність

## Небажана гостра дія

- Прискорене серцебиття, підвищена пітливість
- Спотворене сприйняття глибини, часу, розмірів та форми предметів, відчуття руху нерухомих предметів загострення сприйняття кольорів, звуків та тактильних відчуттів
- Можливі тривожні стани, депресія, запаморочення, дезорієнтація та параноя.
- Розширення зіниць, підвищення температури тіла, нудота та блювання
- Можливі конвульсії

## Наслідки хронічного вживання

- Можливі тривалий тривожний стан та депресії
- Швидкий розвиток толерантності
- «Флешбеки» – нетривалі яскраві повторні переживання колишніх галюцинацій. Можуть відбуватися через кілька днів і навіть місяців після прийому останньої дози, що призводить до дезорієнтації та крайнього виснаження.
- Фізичні розлади, що викликаються довгостроковим споживанням ЛСД, невідомі

The logo for Pharmasco, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

# ГАЛЛЮЦИНОГЕНИ: фенциклідін



## Фенциклідін

Синтетичний наркотик, що володіє анельгезуючим та галюциногенним властивостями.

## Жаргонні назви

Ангельская пыль  
Волшебная пыль  
Ракетное топливо  
Убийственная трава  
Успокаивающие таблетки  
DOA (мертв по прибытии)  
Spice basing (ФЦП с крэком)

### ✓ Форми, що широко використовуються

Кристалічний порошок чи смолиста маса білого, сірого або коричневого кольору	Перназально
Таблетки чи капсули	Пероральний прийом
Рідина	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вдихання</li><li>• Ін'єкції</li></ul>

### ✓ Спосіб введення

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# Механізм дії та наслідки

## Очікуємий ефект

- Зміна мислення, настрою та сприйняття відчуттів
- Позатілесний досвід
- Зміни у сприйнятті свого тіла, відчуття відстороненості та віддаленості

## Небажана гостра дія

- Порушення сприйняття безпосереднього оточення, часто супроводжується відчуттям власної сили та невразливості
- Галюцинації, спотворення зорових образів, гострі афективні розлади, сплутаність свідомості, амнезія
- Можливі гострі тривожні стани, параноя та ворожість з елементами насильства чи психози шизофренічного типу
- Оніміння кінцівок, невиразна мова та втрата координації
- Поверхневе та прискорене дихання, підвищення артеріального тиску, почастишання серцебиття, почервоніння обличчя, підвищене потовиділення, слъозотеча, швидкі та мимовільні рухи очей
- Можливі конвульсії, кома

## Наслідки хронічного вживання

- Розвиток толерантності та сильної психічної залежності
- «Флешбеки» – нетривалі яскраві повторні переживання колишніх галюцинацій. Можуть відбуватися через кілька днів і навіть місяців після прийому останньої дози, що призводить до дезорієнтації та крайнього виснаження.
- Розлад пам'яті
- Мовні порушення (наприклад, заїкуватість чи нездатність говорити)

# ГАЛЛЮЦИНОГЕНИ: кетамін



## Кетамін

Структурний аналог фенциклідину, проте дія трохи слабша.

«Наркотик ґвалтівників»  
Застосовується як засіб для наркозу в медицині та ветеринарії.

## Жаргонні назви

Анестезиюшка  
Кетиш  
Витамин К  
Настя

### ✓ Форми, що широко використовуються

Білий порошок
Таблетки
Рідина

### ✓ Спосіб введення

Вдихання
Перорально
Ін'єкції

Pharmasco®

**ГОСПИТАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ.  
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЕКСПРЕСС-ТЕСТІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ  
НАРКОТИЧНОГО СП'ЯНІННЯ**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

Використання тестів для виявлення наркотиків у сечі "SNIPER" \_\_\_\_\_  
 під час медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого  
 сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість  
 реакції регламентується:

**НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
 УКРАЇНИ № 1167 ВІД 19.05.2020 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
 ПРИМІРНОГО ТАБЕЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  
 ОСНАЩЕННЯ ВІДДІЛЕНЬ ЕКСТРЕНОЇ (НЕВІДКЛАДНОЇ)  
 МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:**

33	Медичні вироби та допоміжні засоби для епістаксису (носової кровотечі), включаючи задні пакети з повітряними кулями	x	
34	Ларингоскопічне дзеркало	x	
35	Набір для промивання шлунка	x	
36	Набір для катетеризації сечового міхура	x	
37	Коагуляційний аналізатор, портативний	x	
38	Швидкі тест-системи на гепатити В,С, ВІЛ, сифіліс, грип, вміст наркотичних речовин тощо	x	відповідно до клінічних протоколів

**НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ № 1103 ВІД 08.05.2020 ПРО  
 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРИМІРНОГО ТАБЕЛЯ  
 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ  
 ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-  
 ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ  
 ДОПОМОГУ:**

	тощо			
23.	Швидкі тести: вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити тощо	Відповідно до розрахованих потреб		
24.	Сумка лікаря/медсестри		1	1



**РОЗДРІБ.  
SNIPER<sup>®</sup> 5, SNIPER<sup>®</sup> 10  
(Alfa Scientific Designs, США)**

*Pharmasco*<sup>®</sup>

# SNIPER® (Alfa Scientific Designs, США)

ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 5 НАРКОТИКІВ  
**SNIPER®**



ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 10 НАРКОТИКІВ  
**SNIPER®**



Pharmasco®

# Конкурентний аналіз

Наркотична речовина	SNIPER 10	Express Test 10	SNIPER 5	Express Test 5
Амфетамін	500	1000	500	1000
Морфін/опіати	300	2000	300	2000
Кокаїн	300	300	300	
Метамфетамін	500	500	500	500
Метадон	300	300		
МДМА(екстазі)	500	500		500
Марихуана	50	50	50	50
<b>Синтетична маріхуана (спайс)</b>	<b>50</b>			
<b>Трамадол</b>	<b>200</b>			
<b>Бупренорфін</b>	<b>10</b>			
Фенциклідін		25		
Барбитурати		300		
Бензодіазепін		300		

# Переваги

---

- SNIPER® 10 – унікальна комбінація (наявність тестування на спайс (синтетична маріхуана), трамадол, бупренорфін)
- Американська якість
- Формат теста: тест-касета
- Дві методики тестування:
  - метод занурення
  - крапельний метод

*Pharmasco*®

**Дякую  
за увагу!**

*Pharmasco*<sup>®</sup>